

感染症発生動向調査（インフルエンザ／COVID-19定点）

調査期間 令和 年 月 日 ～ 年 月 日

医療機関名：

上気道炎患者数（インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）等も含む上気道炎と診断した全て）

| 年齢群  |   | 0～5<br>ヶ月 | 6～<br>11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～<br>14 | 15～<br>19 | 20～<br>29 | 30～<br>39 | 40～<br>49 | 50～<br>59 | 60～<br>69 | 70～<br>79 | 80歳<br>以上 | 合計 |
|------|---|-----------|------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 上気道炎 | 男 |           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |
|      | 女 |           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |

インフルエンザ患者数

| 年齢群                                                            |   | 0～5<br>ヶ月 | 6～<br>11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～<br>14 | 15～<br>19 | 20～<br>29 | 30～<br>39 | 40～<br>49 | 50～<br>59 | 60～<br>69 | 70～<br>79 | 80歳<br>以上 | 合計 |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| インフルエンザ <sup>(注1)</sup><br>(症状定義：38.0℃<br>以上発熱、上気道症<br>状、全身症状) | 男 |           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |
|                                                                | 女 |           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |

（注1）感染症法届出基準に基づき、臨床的に症状からインフルエンザと診断した症例数で、インフルエンザ迅速診断キット施行の有無を問わない。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）患者数

| 年齢群                 |   | 0～5<br>ヶ月 | 6～<br>11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～<br>14 | 15～<br>19 | 20～<br>29 | 30～<br>39 | 40～<br>49 | 50～<br>59 | 60～<br>69 | 70～<br>79 | 80歳<br>以上 | 合計 |
|---------------------|---|-----------|------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 新型コロナウイルス<br>感染症（※） | 男 |           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |
|                     | 女 |           |            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |

（※）新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である）

特記事項

発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状を有するものを診察した結果、医師が総合的に判断し臨床的に上気道炎と診断したものを計上。（インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、RSV、hMPV等、すべてを含む。）

インフルエンザと診断したものを計上  
臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からインフルエンザが疑われ、かつ、①のすべてを満たすか、①のすべてを満たさなくても②を満たすことにより、インフルエンザ患者と診断した場合  
①ア 突然の発症  
イ 高熱  
ウ 上気道症状  
エ 全身倦怠感等の全身症状  
②迅速診断キットによる病原体の抗原の検出  
鼻腔吸引液、鼻腔拭い液、咽頭拭い液

新型コロナウイルス感染症と診断したものを計上  
臨床的特徴を有する者について、別に掲げる検査方法により当該者を新型コロナウイルス感染症と診断した場合又は発熱または呼吸器症状（軽症の場合を含む。）を呈する者であって、COVID-19であることが確定したものと同居している者（飲食、入浴、就寝等を共にする家族や同居者）であり、医師が総合的に判断した結果、COVID-19と臨床的に診断する場合