

## 三重県感染症発生動向調査情報(2026年4月分)

### 1 月届出対象5類感染症(基幹定点)

基幹定点(9定点)から届出があった薬剤耐性菌感染症は、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が35人で、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症の届出はなかった。なお、2026年4月6日から薬剤耐性緑膿菌感染症は、名称及び届出のために必要な検査所見を変更し、多剤耐性緑膿菌感染症として全数把握疾患となっており、4月1日から5日までの三重県内での発生はなかった。

### 2 三重県独自の調査様式によるSTD定点届出情報

性器クラミジア感染症が32人(有症状:男5人、女10人、無症状:男2人、女15人)と最も多く、淋菌感染症(咽頭を除く)が5人(有症状:男3人、女1人、無症状:女1人)、性器ヘルペスウイルス感染症が4人(男4人)、尖圭コンジローマ2人(男2人)、咽頭クラミジア(無症状:男女各1人)及びその他(膣トリコモナス)1人の報告があった。混合感染は、性器クラミジア(有症状)/淋菌(有症状)の女性1人、性器クラミジア(有症状)/膣トリコモナスの女性1人、性器クラミジア(無症状)/淋菌(無症状)の女性1人の報告があった。年齢階級別で多かったのは、男は20代後半が5人、次いで10代後半・20代前半・30代後半・55歳以上が各2人及び30代前半・40代後半・50代前半は各1人、女は20代前半が10人、次いで20代後半が5人、10代後半が4人、30代前半が4人、30代後半が2人であった。受診契機は、男女とも「有症状」が22人(男12人、女10人)で最も多く、「パートナー有症状」が6人(男2人、女4人)、「妊婦検診」が女6人等であった。その他の状況について、異性間接触が19人(男3人、女16人)、CSW従事者が2人(女2人)、「CSWとの接触」3人(男3人)であった。

性感染症の詳細は [こちら](#)

薬剤耐性細菌の詳細は [こちら](#)

全国集計は [こちら](#)

(全国週報のうち「\*何月報含む」と記載のある週をご覧ください。)

表1. 2026年4月の患者届出数（STD、基幹定点） - 保健所管内別

保健所名		桑名	四日市市	鈴鹿	津	松阪	伊勢	伊賀	尾鷲	熊野	三重県		患者数 ／ 定点	先 月 比		
定 点 数	STD	2	3	2	2	2	2	2	1	1	17					
	基 幹	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9					
感 染 症 名 ・ 性 別	性器クラミジア感染症	男	1		3					1	5	15	0.9	1.0		
		女			3	6			1	10						
	性器ヘルペスウイルス 感染症	男	3		1							4	4	0.2	0.8	
		女										0				
	尖圭コンジローマ	男	2										2	2	0.1	---
		女											0			
	淋菌感染症	男	2				1						3	4	0.2	0.7
女				1								1				
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	男	3	4			2	7	2	3	2	23	35	3.9	0.9		
	女	1	4	2					2	3	12					
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	男											0	0	0.0	---	
	女											0				
薬剤耐性緑膿菌感染症	男											0	0	0.0	---	
	女											0				



表3. 三重県独自の調査様式によるSTD定点届出情報（2026年4月）

感染症名	性	年齢階級別届出数											受診契機*					その他の状況*									
		0 9 歳	10 14 歳	15 19 歳	20 24 歳	25 29 歳	30 34 歳	35 39 歳	40 44 歳	45 49 歳	50 54 歳	55 歳 以上	計	有 症 状	バ ー ト ナ ー が 有 症 状	妊 婦 健 診	人 工 妊 娠 中 絶	自 己 検 査 陽 性	不 妊 治 療	そ の 他	異 性 間 性 的 接 触	同 性 間 性 的 接 触	C S W * *	C S W と の 接 触	コ ン ド ム 不 使 用	バ ー ト ナ ー が 複 数	
有 症 状	性器クラミジア感染症	男			1	2	1	1				5	3								2				1	1	
		女		2	4	2	2					10	10	1								8		1			
	咽頭クラミジア感染症	男										0	0														
		女										0	0														
	性器ヘルペスウイルス感染症	男						1				1	2	4	4												
		女								1				0	0												
	尖圭コンジローマ	男				1						1	2	2	2												
女												0	0														
淋菌感染症（咽頭を除く）	男		1		2							3	3	3										2			
	女		1									1	1	1							1						
淋菌感染症（咽頭）	男										0	0															
	女										0	0															
無 症 状	性器クラミジア感染症	男		1	1							2	2	2	2	6			1	1	1			1		2	
		女		2	6	3	2	2					15	1	1	3	6					8		1		1	
	咽頭クラミジア感染症	男					1					1	1	1	1						1				1	1	
		女						1				1	1	1	1						1				1	1	
	淋菌感染症（咽頭を除く）	男										0	0														
女				1							1	1	1	1							1				1	1	
淋菌感染症（咽頭）	男										0	0															
	女										0	0															
その他の感染症	男										0	0															
	女					1					1	1	1	1									1				
再 掲	性器クラミジア(有症状)/咽頭クラミジア(無症状)																										
	男																										
	性器クラミジア(有症状)/淋菌(有症状)																										
	女																										
	性器クラミジア(有症状)/脛トリコモナス																										
	女																										
性器クラミジア(無症状)/咽頭クラミジア(無症状)																											
女																											
性器クラミジア(無症状)/淋菌(無症状)																											
女																											

\*泌尿器科・皮膚科9定点、産婦人科8定点からの届出数である。  
 ※：「受診契機」及び「その他の状況」は複数回答のため届出数と一致しない。  
 ※※：性風俗産業従事者